

## หนอนคืบ

นำเสนอเมื่อ : 24 มิ.ย. 2551

หนอนคืบ โดย นายชูเกียรติ อธิรัตน์ และ นายภาค โพธิแทน

Semilooper, Family Noctuidae Order Lepidoptera

### ถิ่นแพร่ระบาด

แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย

### ลักษณะของแมลง

ผีเสื้อรูปยาวรี ริมปีกคู่หน้ามีรอยเว้า สีค่อนข้างสดใส โดยมีสีน้ำตาลทองเป็นพื้น และมีริ้วเป็นลูกคลื่น สีน้ำตาลแกดัดตามขวาง ขาวางเดี่ยวๆ บนใบ ขาคู่แรกตอนปลายลำตัวหายไป หนอนจึงงอลำตัวส่วนกลางเพื่อเคลื่อนไหว หัว ลำตัว และขาสี่เขี้ยวอมเหลืองขีด หนอนโตเต็มที่ ยาวประมาณ ๓๐ มิลลิเมตร

การเข้าตักแด

หนอนสร้างรังล้อมระหว่างใบฝ้ายที่ถูกพับหรือระหว่างสมอกับใบเลี้ยง หรือในเศษขยะบนพื้นดิน

### ชีวิจักร

ระยะไข่ ๓-๔ วัน

ระยะหนอน ๙-๑๑ วัน

ระยะก่อนเข้าตักแด ๑-๒ วัน

ระยะตักแด ๘-๙ วัน

ผีเสื้ออายุ ๑๘-๓๐ วัน

รวมอายุขัย ๓๙-๕๖ วัน

ผีเสื้อตัวเมียตัวหนึ่งวางไข่ได้ ๑๒-๒๔ ครั้ง จำนวน ๒๔๗-๖๐๗ ฟอง

### พืชอาศัย

พืชจำพวกฝ้าย กระเจี๊ยบ ครอบจักรวาล

### ศัตรูธรรมชาติ

ตัวเบียน ใต้ตรวจพบมีแมลงวันลาย (Tachinid fly, *Sturmia* sp.)

แตนชาลซิด (Chalcid wasp, *Brachymeria* sp.) แตนอิกนิวโมนิด (Ichneumonid wasp, *Xanthopiimpla punctator*) แตนแบรคอนิด (Braconid wasp, *Apanteles* sp.)

### ลักษณะการทำลายและความเสียหาย

หนอนทุกขนาดกัดกินใบฝ้าย ระบาดในระยะเวลาฝ้ายอายุประมาณ ๘๐ วัน กัดกินใบฝ้ายจนเป็นรูพรุนเห็นได้ชัดในไร่ ความเสียหายไม่คอยรุนแรงนัก นอกจากระบาดมากจริงๆ จนกินใบฝ้ายหมดทั้งต้น ก็จะเป็นเหตุให้พืชขาดอาหารในการที่จะส่งไปบำรุงดอกและสมอเช่นเดียวกับหนอนม้วนใบ

### บรรณานุกรม

- นายชูเกียรติ อธิรัตน์
- นายภาค โพธิแทน



หนอนคืบ

[ดูภาพทั้งหมดในเรื่องนี้]