

หนอนคืบ

🕒 นำเสนอเมื่อ 24 มิ.ย. 2551

หนอนคืบ โดย นายชูเกียรติ อิทธิวัชร์ และ นายภาค โพธิ์แทน

Semilooper, Family Noctuidae Order Lepidoptera

ถิ่นแพร่ระบาด

แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย

ลักษณะของแมลง

ผีเสื้อรูปยาวรี ริมปีกคู่หน้ามีรอยเว้า สีค่อนข้างสดใส โดยมีสีน้ำตาลทองเป็นพื้น และมีริ้วเป็นลูกคลื่น สีน้ำตาลแกดัดตามขวาง ไชวางเดี่ยวๆ บนใบ ขาคู่แรกตอนปลายลำตัวหายไป หนอนจึงงอลำตัวส่วนกลางเพื่อเคลื่อนไหว หิว ลำตัว และขาสี่เขี้ยวอมเหลืองซีด หนอนโตเต็มที่ ยาวประมาณ ๓๐ มิลลิเมตร

การเข้าตักแต่

หนอนสร้างรังล้อมระหว่างใบฝายที่ถูกพับหรือระหว่างสมอกับใบเลี้ยง หรือในเศษขยะบนพื้นดิน

ชีวิจักร

ระยะไข่ ๓-๔ วัน

ระยะหนอน ๙-๑๑ วัน

ระยะก่อนเข้าตักแต่ ๑-๒ วัน

ระยะตักแต่ ๘-๙ วัน

ผีเสื้ออายุ ๑๘-๓๐ วัน

รวมอายุขัย ๓๙-๕๖ วัน

ผีเสื้อตัวเมียตัวหนึ่งวางไข่ได้ ๑๒-๒๔ ครั้ง จำนวน ๒๔๗-๖๐๗ ฟอง

พืชอาศัย

พืชจำพวกฝ้าย กระจับปี่ ครอบจักรวาล

ศัตรูธรรมชาติ

ตัวเบียน ใต้ตรวจพบมีแมลงวันลาย (Tachinid fly, *Sturmia* sp.)

แตนชาลซิด (Chalcid wasp, *Brachymeria* sp.) แตนอิกนิวโมนิด (Ichneumonid wasp, *Xanthopiimpla punctator*) แตนแบรคโอนิด (Braconid wasp, *Apanteles* sp.)

ลักษณะการทำลายและความเสียหาย

หนอนทุกขนาดกัดกินใบฝาย ระบาดในระยะเวลาฝ้ายอายุประมาณ ๘๐ วัน กัดกินใบฝายจนเป็นรูพรุนเห็นไตชัดในไร่ ความเสียหายไม่คอยรุนแรง นอกจากระบาดมากจริงๆ จนกินใบฝายหมดทั้งต้น ก็จะเป็นเหตุให้พืชขาดอาหารในการที่จะส่งไปบำรุงดอกและสมอเช่นเดียวกับหนอนม้วนใบ

บรรณานุกรม

- นายชูเกียรติ อิทธิวัชร์
- นายภาค โพธิ์แทน



[ดูภาพทั้งหมดในเรื่องนี้]