หนอนคืบ

นำเสนอเมื่อ : 24 มิ.ย. 2551

หนอนคืบ โดย นายชูเกียรติ อิฐรัชต์ และ นายนาค โพธิแท่น

Semilooper, Family Noctuidae Order Lepidoptera

ถิ่นแพร่ระบาด
แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย

ลักษณะของแมลง
ผีเสื้อรูปยาวรี ริมปีกคู่หน้ามีรอยเว้า สีค่อนข้างสดใส โดยมีสีน้ำตาลทองเป็นพื้น แลวมีริ้วเป็นลูกคลื่น สีน้ำตาลแกตัดตามขวาง
ไขวางเดี่ยวๆ บนใบ ขาคู่แรกตอนปลายลำตัวหายไป หนอนจึงงอลำตัวส่วนกลางเพื่อเคลื่อนไหว หัว ลำตัว และขาสีเขียวอมเหลืองซีด หนอนโตเต็มที่ ยาวประมาณ ๓๐ มิลลิเมตร
การเข้าดักแด้
หนอนสร้างรังล้อมระหว่างใบฝ้ายที่ถูกพับหรือระหว่างสมอกับใบเลี้ยง หรือในเศษขยะบนพื้นดิน



หนอนคืบ

[ดูภาพทั้งหมดในเรื่องนี้]

ชีพจักร
ระยะไข่ ๓-๔ วัน
ระยะหนอน ๙-๑๑ วัน
ระยะก่อนเข้าดักแด้ ๑-๒ วัน
ระยะดักแด้ ๘-๙ วัน
ผีเสื้ออายุ ๑๘-๓๐ วัน
รวมอายุขัย ๓๙-๕๖ วัน
ผีเสื้อตัวเมียตัวหนึ่งวางไข่ได้ ๑๒-๒๔ ครั้ง จำนวน ๒๔๗-๖๐๗ ฟอง

พืชอาศัย
พืชจำพวกฝ้าย กระเจี๊ยบ ครอบจักรวาล

ศัตรูธรรมชาติ
ตัวเบียน ได้ตรวจพบมีแมลงวันลาย (Tachinid fly, Sturmia sp.) แตนชาลซิด (Chalicid wasp, *Brachymeria* sp.) แตนอิกนิวโมนิด (Ichneumonid wasp, *Xanthopiimpla punctator*) แตนแบรคอนิด (Braconid wasp, *Apanteles* sp.)

ลักษณะการทำลายและความเสียหาย
หนอนทุกขนาดกัดกินใบฝ้าย ระบาดในระยะฝ้ายอายุประมาณ ๘๐ วัน กัดกินใบฝ้ายจนเป็นรูพรุนเห็นไดชัดในไร่ ความเสียหายไม่ค่อยรุนแรงนัก นอกจากระบาดมากจริงๆ จนกินใบฝ้ายหมดทั้งต้น ก็จะเป็นเหตุให้พืชขาดอาหารในการที่จะส่งไปบำรุงดอกและสมอเช่นเดียวกับหนอนม้วนใบ

บรรณานุกรม

- นายชูเกียรติ อิฐรัชต์
- นายนาค โพธิแทน