

การวัดมุมเป็นเรเดียน

🕒 นำเสนอเมื่อ 17 ก.ค. 2555

การวัดมุมเป็นเรเดียน

✘ การวัดมุมในอีกมาตราหนึ่ง แทนที่จะเป็นองศา และแบ่งเป็น 360 องศา ก็ใช้หลักการของ arctan หรือมุมที่จะบอกค่าของ tan เช่น

arctan (1) มีค่าเท่ากับ 45 องศา ✘

✘ จากหลักการของทฤษฎี ทำให้เราได้ $a^2 + b^2 = h^2$

ดังนั้นเราแบ่งสามเหลี่ยมออกเป็นสามส่วน ด้านฐาน 2 ส่วน แบ่งครึ่งเป็น 1 ส่วน และได้มุม 60 องศา และ 30 องศา ดังนั้น ความสูง $h^2 =$

✘ $2^2 - 1^2 = 3$ หรือได้ความสูง = ✘ 3

หากเราคิดค่าความลาดชันตามที่ได้กล่าวแล้ว เราจะได้ฟังก์ชัน arctan ซึ่งเราอาจเขียนสั้น ๆ ว่า atan

ในปี 1672 เจมส์ กริกอริ ได้เสนอสูตรในการคำนวณค่า arctan ของมุมความชันจนถึงค่า 45 องศา ดังนี้

✘

ค่าที่คำนวณมาได้เป็นมุมในหน่วยเรเดียน โดยใช้หลักการส่วนของวงกลมตามมุมที่แบ่ง

$$360^\circ = 2\pi \quad \text{เรเดียน}$$

$$180^\circ = \pi \quad \text{เรเดียน}$$

$$90^\circ = \pi/2 \quad \text{เรเดียน}$$

✘ ดังนั้น 1 องศา จึงเท่ากับ $2\pi/360$ เรเดียน

ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์